



ศูนย์ปฏิบัติการข้าวเกษตร

สำนักงานเกษตรอำเภอสुकิริน
อำเภอสुकิริน จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๙๐
โทร, โทรสาร ๐ ๗๓๖๕ ๖๐๖๗

E-mail : sukhirin_nwt@doae.go.th Web site : <http://sukhirin.narathiwat.doae.go.th>

สส.๐๑๘/๒๕๕๖

ฮอร์โมนไข่....ใช้ประโยชน์ได้รอบด้าน



เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยกระบวนการธรรมชาติ โดยการหมักกากน้ำตาล ไข่ไก่สดและจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ซึ่งเกษตรกรจะรู้จักในนามของ “ฮอร์โมนไข่ซูเปอร์ MT ” ซึ่งส่วนผสมทั้งสามชนิด ผสมกันอย่างลงตัวทำให้ฮอร์โมนไข่ มีสารอาหารที่อยู่ในรูปของคาร์บอนและอื่นๆที่เป็นประโยชน์ ต่อพืชอย่างมากมาย เสริมด้วยธาตุอาหารต่างๆ อาทิเช่น แมกนีเซียม สังกะสี โบรอน เหล็ก ทองแดง และอื่นๆ เสริมด้วยซิลิสิค แอตซิด หรือซิลิกา ประโยชน์ของฮอร์โมนไข่ จะช่วยเร่งการเจริญเติบโต กระตุ้นตาดอกผลดก ลดการหลุดร่วงของผล ช่วยยืดช่อดอกในไม้ดอกและพืชผักกินดอกบางชนิด กระตุ้นการแตกยอด ยอดยาว อวบใบใหญ่ ลดดินทำให้ดินร่วนซุย เพิ่มจุลินทรีย์ในดินและเสริมสร้างการย่อยอินทรีย์วัตถุในดิน ทำให้พืชแข็งแรง ป้องกันเพลี้ย หนอน ไร และเชื้อราต่างๆได้ดีอีกด้วย เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด



สูตรฮอร์โมนไข่ที่ใช้กับพืชจะมีส่วนประกอบดังนี้

- ไข่ไก่ทั้งฟอง ๕ กก.
- กากน้ำตาล ๕ กก.
- แปะข้าวหมาก ๑ ลูก
- ยาคุม ๑ ขวด

วิธีทำ

- ตอกไข่ แล้วบดให้ละเอียด
- ใส่ส่วนผสมทุกอย่างคลุกให้เข้ากัน
- ใส่ถังพลาสติก ปิดฝาให้สนิท อย่าให้อากาศเข้าได้
- ประมาณ ๒ - ๓ วัน เปิดฝาคนให้ทั่วกันตักตะกอน แล้วปิดฝาให้แน่นทิ้งไว้ ๗ วัน นำมาใช้ได้

วิธีใช้ การใช้ฮอร์โมนไข่เร่งการออกดอกของพืชให้ใช้ในอัตราส่วน ๒-๓ ช้อนกาแฟ น้ำ ๒๐ ลิตร ฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น ๗-๑๐ วัน/ครั้ง กรณีที่ใช้ในไม้ผลไม่ว่าจะเป็นการผลิต ในหรือนอกฤดูการผลิต เกษตรกรต้องบำรุงต้นพืชให้สมบูรณ์ที่สุดก่อน แล้วค่อยเร่งการออกดอกด้วยฮอร์โมนไข่โดยเริ่มฉีดพ่นตั้งแต่ติดใบอ่อนรุ่นที่ ๓ ประมาณ ๓๐-๔๕ วัน ไม้ผลจะติดดอก ๕๐-๘๐ เปอร์เซ็นต์ ของทรงพุ่มต้องหยุดฉีดพ่นฮอร์โมนไข่ทันที ถ้าพ่นต่อไปจะทำให้ดอกร่วง ฮอร์โมนไข่สูตรนี้มีความเข้มข้นและความเค็มสูง ถ้าต้องการให้ออกดอกนอกฤดูต้องให้มีช่วงฝนทิ้งช่วงหรือทิ้งช่วงการให้น้ำ ๑๔-๒๑ วัน/ครั้ง แล้วฉีดพ่นด้วยฮอร์โมนไข่ ๗-๑๐ /ครั้ง ไม้ผลก็จะออกดอก จากนั้นฉีดพ่นด้วยน้ำหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมนผลไม้ต่อไปอีก ๗-๑๐ วัน/ครั้ง เพื่อบำรุงผลผลิตให้สมบูรณ์ ส่วนการใช้ในข้าว พืชไร่ พืชผักและไม้ดอกไม้ประดับ ควรฉีดพ่นตั้งแต่พืชตั้งตัวได้จนถึงออกดอกเกิน ๕๐% จึงหยุดพ่น แต่ไม่ควรใช้ฮอร์โมนไข่เร่งดอกในพืชผักกินใบ เช่น คะน้า ผักกาดขาว ผักกาดหอม เพราะพืชผักเหล่านี้จะออกดอก ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพต่ำ และขายไม่ได้ราคา

นางสาวโสมฤทัย อินทมะโน ภาพ / ข่าว
มิถุนายน ๒๕๕๖